

MOVIPREP

- **PREPARAZIONE con MOVIPREP (2 litri preparazione + 1 litro di liquidi chiari)**


Acquistare in farmacia 1 confezione di MOVIPREP (GUSTO LIMONE) oppure 1 confezione di MOVIPREP GUSTO ARANCIO in base alla preferenza.

Come preparare le due dosi di **MOVIPREP**:


1° Litro di preparazione: Busta A+ Busta B in un contenitore con 1 litro di acqua+ 1/2 litro di liquidi chiari

2° Litro di preparazione: Busta A+ Busta B in un contenitore con 1 litro di acqua+1/2 litro di liquidi chiari

PRIMO LITRO



SECONDO LITRO



Esame da eseguire dalle ore 8 alle 10: il giorno precedente l'esame sciogliere l'intero contenuto di una busta trasparente di MOVIPREP (contenente buste A+B) in un litro di acqua e bere rapidamente dalle ore 18,00 alle ore 19,00 un bicchiere grande da 250 ml (1/4 di litro) ogni 15 minuti circa. Bere poi almeno ½ litro di acqua. Cena liquida (the, camomilla, acqua zuccherata)

Dalle 20,30 circa (sempre del giorno precedente l'esame): sciogliere l'intero contenuto di una busta trasparente di MOVIPREP (contenente buste A+B) in 1 litro di acqua e bere rapidamente in circa un'ora (approssimativamente) un bicchiere grande da 250 ml (1/4 di litro) ogni 15 minuti. Bere poi almeno ½ litro di acqua quando si è finito di assumere tutta la soluzione con il preparato. Successivamente è possibile assumere liquidi chiari (acqua, the, camomilla NB. non ingerire più cibi solidi).

-la mattina dell'esame presentarsi a digiuno (salvo ingestione di poco liquido zuccherato se necessario)

Esame da dopo le ore 10: il giorno precedente l'esame sciogliere l'intero contenuto di una busta trasparente di MOVIPREP (contenente buste A+B) in un litro di acqua e bere rapidamente dalle ore 18,00 alle ore 19,00 un bicchiere grande da 250 ml (1/4 di litro) ogni 15 minuti circa. Bere poi almeno ½ litro di acqua.

A Cena è concesso mangiare solo liquidi, esempio un brodo (senza pasta) e/o bere liquidi chiari zuccherati.

Il giorno stesso dell'esame: sciogliere l'intero contenuto di una busta trasparente di MOVIPREP (contenente buste A+B) in 1 litro di acqua e bere rapidamente dalle ore 6,00 alle ore 7,00 un bicchiere grande da 250 ml (1/4 di litro) ogni 15 minuti. Bere poi almeno ½ litro di acqua

- la mattina dell'esame presentarsi a digiuno (salvo ingestione di poco liquido zuccherato se necessario)

Colonscopia dopo le ore 14: il giorno stesso dell'esame non è permessa la colazione, alle ore 8,00 sciogliere l'intero contenuto di due buste trasparenti di MOVIPREP (ciascuna contenenti buste A+B) in due litri di acqua (l'intero contenuto di ogni busta trasparente in 1 litro di acqua) e bere tra le ore 8,00 e le ore 10,00 (bere possibilmente rapidamente: un bicchiere grande da 250 ml (1/4 di litro) ogni 15 minuti). Bere poi almeno 1 litro di acqua. 2 ore prima dell'inizio dell'esame interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.